

toxikologickému informačnímu středisku na čísle +420 224 919 293. Dále se mohou objevit abstinenci příznaky při vysazení nikotinu. Ty mohou zahrnovat podrážděnost, agresivitu, pocit slabosti, úzkost, neklid, špatnou koncentraci, zvýšenou chuť k jídlu, nutkání k kouření, poruchy spánku a snížení srdeční frekvence.

Návykovost:

Tento produkt obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou, proto není doporučen nekuřákům. Žádná jiná složka obsažená v produktu není návyková.

Toxicita:

Tento výrobek obsahuje nikotin, který může mít toxické účinky při perorální konzumaci, zejména u kojenců a dětí. NEPIJTE tento přípravek! V případě spolknutí, navštivte okamžitě svého praktického lékaře s tímto příbalovým letákem. Pokud se Vám vylíže na kůži, oplachujte studenou vodou po dobu 10-15 minut.

Návod k použití:

1. Odstraňte všechny vnější obaly produktu
2. Odstraňte z produktu všechny pryžové uzávěry
3. Potáhněte si, jakoby jste kouřili obyčejnou cigaretu.

Distributor:

EUROLIT EU, MB

Eisiskiu pl. 47-312, LT-02184 Vilnius

sales@eurlit.com



K#PWA



(CZ) VAROVÁNÍ: TENTO PRODUKT NENÍ UR ČEN PRO MLADISTVÉ A NEKUŘÁKY.

Nedoporučujeme užívat mladistvým, dále pak těhotným a kojícím ženám.

Předtím než začnete používat tento produkt, přečtěte si prosím pečlivě tento příbalový leták. Tento leták nevyhazujte, jelikož obsahuje důležité informace, které by se Vám mohly hodit.

Instrukce k užívání a skladování produktu:

Vždy se ujistěte, že je nádoba uzavřená a ve vzpřímené poloze.

Produkt skladujte v teplotě 18-30 °C a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.

Neuchovávejte ho v lednici, nezmrazujte, nezahřívejte a neskladujte výrobek při teplotě nad 30 °C.

Možné kontraindikace:

Propylenglykol:

- U jedinců užívajících Disulfiram (Antabus) nebo Metronidazol může vyvolat nežádoucí účinky.
- Může vyvolat alergickou reakci u lidí trpících atopií, dětským ekzémem či sennou rýmou.
- Laktázová acidóza se může projevit, pokud velké množství propylenglykolu zkonzumují děti, těhotné ženy či jedinci s jaterním nebo ledvinovým selháním.

Glycerol:

- Šance na dehydrataci je zvýšená u starších osob a jedinců trpících na dehydrataci.
- Opatrnosti je třeba dbát u lidí s diabetem, jelikož metabolizovaný glycerol může způsobit mírnou hyperglykémii nebo glykosurii.

Možné nežádoucí účinky:

Při prvním užití se může objevit podráždění v ústech, sucho v krku a kašel. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhoršují, navštivte vašeho praktického lékaře a nahlaste podrobnosti o potížích