



ELFBAR

**(CS)UPOZORNĚNÍ:
TENTO PRODUKT SE
NEDOPORUČUJE PRO
NEKUŘÁKY A OSOBY
MLADŠÍ 18LET.**

Tento produkt se nedoporučuje používat u dětí a těhotných a kojících žen.

Než začnete tento výrobek používat, pečlivě si přečtěte tento návod. Uchovejte si tento návod, protože obsahuje důležité informace, které můžete znovu potřebovat.

**NÁVOD PRO
UCHOVÁVÁNÍ
PRODUKTU:**

Vždy se ujistěte, že je nádoba pořádně uzavřena a ve vertikální poloze.

Uchovávejte produkt v teplotě 18-30°C a mimo přímé sluneční světlo.

Nedávejte do lednice a mrazáku, neohřívejte a neuchovávejte v teplotě nad 30°C.

MOŽNÉ KONTRAINDIKACE:

Propan 1,2-diol

• Může vyvolat nežádoucí účinky u jedinců léčených disulfiramem nebo metronidazolem

• Alergické reakce se mohou objevit u jedinců s atopií, dětským ekzémem nebo rýmou (senná rýma)

• Laktátová acidóza se může objevit, když velké množství propylenglykolu konzumují děti, těhotné ženy nebo jedinci s jaterním nebo renálním selháním.

Glycerol

• Šance na dehydrataci jsou zvýšené u starších a již dehydratovaných jedinců

• Opatrnosti je třeba dbát u jedinců s diabetem, protože metabolizovaný glycerol může způsobit mírnou hyperglykémii nebo glykosurii.

**MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ
ÚČINKY:**

První uživatelé e-cigarety mohou pociťovat podráždění úst, sucho v krku nebo kašel. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se stanou závažnými, navštivte praktického lékaře a nahláste podrobnosti o incidentu podle pokynů uvedených v části „Hlášení nežádoucích účinků“.

Abstinenční účinky nikotinu se mohou objevit také při použití nedostatečné síly k uspokojení vašich chutí. Ty mohou zahrnovat