

# Návod pro uživatele:

# Složení produktu:

**CZECH**

**ZAŘÍZENÍ REYMONT 688\*1  
UŽIVATELSKÝ MANUÁL\*1**

**Přečtěte si pečlivě veškeré příbalové informace, než začnete používat tento produkt.**

**550 mAh**

Zařízení The Reymont 688 je určené pouze pro dospělé kuřáky. Tento produkt nedoporučujeme používat nekuřákům, nezletilým, těhotným či kojícím ženám a nemocným lidem.

**688 potáhnutí** \*přibližně

**20mg**

**Množství nikotinu na jedno vdechnutí: 95.93ug  
Dávka nikotinu na vdechnutí: 0.029mg**

## ÚVOD

· Nikotinové soli jsou specifickou formou používanou v zařízeních s nízkým výkonem

· Nikotinové soli mají vysoký podíl nikotinu, dostupné ve variantách 10mg a 20mg

· Nikotinové soli jsou vyrobeny tak, aby byly šetrné k hrdlu i přes vysoký podíl nikotinu

· Začátečníci by měli užívat produkty s nižším obsahem nikotinu

## VAROVÁNÍ

**Produkty obsahující nikotin nejsou vhodné pro:**

· Nekuřáky

· Nezletilé (pod 18 let)

· Těhotné a kojící ženy, jelikož nikotin proniká do placenty a vylučuje se do mateřského mléka

· Pro lidi trpící nemocemi, jako jsou srdeční onemocnění, žaludeční a dvanácterníkové vředy, problémy s játry a ledvinami, dlouhodobé onemocnění krku, potíže s dýcháním, bronchitida, rozedma plic nebo astma.

· Jedince se zvýšenou činností štítné žlázy, feochromocytomem (nádor nadledvin),

· Diabetiky, protože nikotin může ovlivnit hladinu cukru v krvi

· Pro jedince užívající následující léky:

- Theofylin (k léčbě respiračních onemocnění)

- Ropinirol (k léčbě syndromu neklidných nohou a Parkinsonovy choroby)

- Klozapin (k léčbě schizofrenie)

## MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pokud inhalujete velké množství nikotinu nebo používáte produkt moc často, může se objevit některý z následujících účinků:

- Slabost
- Nevolnost
- Bolest hlavy
- Kašel
- Podráždění ústní dutiny či krku
- Závrať
- Žaludeční nevolnost
- Škytavka
- Ucpaný nos
- Zvracení
- Bušení srdce
- Abnormální srdeční frekvence

Pokud trpíte jinými projevy, které nejsou uvedeny výše, přestaňte používat produkt. Pokud projevy přetrvávají, kontaktujte svého lékaře a přineste mu příbalový leták.

## NÁVYKOVOST

Nikotin je vysoce návykovou látkou, produkt je proto určen jen pro zletilé kuřáky.

## JAK ZAŘÍZENÍ SKLADOVAT

Skladujte při teplotě do 25°C na čistém a suchém místě. Udržujte produkt mimo dosah dětí a zvířat.

Výrobce:

ReyMont Technology Co., Ltd

Adresa:

8A2 Building, Zhigao Industrial Park,  
YangTian Road, Xing Dong, BaoAn  
District,  
Shenzhen, China, 518101

Web: [www.reyomnttech.com](http://www.reyomnttech.com)

Email: [Info@reyomnttech.com](mailto:Info@reyomnttech.com)

Instagram ID: [reymont\\_vapecom](https://www.instagram.com/reymont_vapecom)



REYMONTECHNOLOGY CO., LTD

[Info@reyomnttech.com](mailto:Info@reyomnttech.com)

toxikologickému informačnímu středisku na čísle +420 224 919 293. Dále se mohou objevit abstinenční příznaky při vysazení nikotinu. Ty mohou zahrnovat podrážděnost, agresivitu, pocit slabosti, úzkost, neklid, špatnou koncentraci, zvýšenou chuť k jídlu, nutkání k kouření, poruchy spánku a snížení srdeční frekvence.

#### Návykovost:

Tento produkt obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou, proto není doporučen nekuřákům. Žádná jiná složka obsažena v produktu není návyková.

#### Toxicita:

Tento výrobek obsahuje nikotin, který může mít toxické účinky při perorální konzumaci, zejména u kojenců a dětí. NEPIJTE tento přípravek! V případě spolknutí, navštivte okamžitě svého praktického lékaře s tímto příbalovým letákem. Pokud se Vám vylije na kůži, oplachujte studenou vodou po dobu 10-15 minut.

#### Návod k použití:

1. Odstraňte všechny vnější obaly produktu
2. Odstraňte z produktu všechny pryžové uzávěry
3. Potáhněte si, jakoby jste kouřili obyčejnou cigaretu.

#### Distributor:

EUROLIT EU, MB  
Eisiskiu pl. 47-312, LT-02184 Vilnius  
sales@eurlit.com



[www.reymonttech.com](http://www.reymonttech.com)



**(CZ) VAROVÁNÍ: TENTO PRODUKT NENÍ UR ČEN PRO MLADISTVÉ A NEKUŘÁKY.**

**Nedoporučujeme užívat mladistvým, dále pak těhotným a kojícím ženám.**

Předtím než začnete používat tento produkt, přečtěte si prosím pečlivě tento příbalový leták. Tento leták nevyhazujte, jelikož obsahuje důležité informace, které by se Vám mohly hodit.

#### Instrukce k užívání a skladování produktu:

Vždy se ujistěte, že je nádoba uzavřená a ve vzpřímené poloze.

Produkt skladujte v teplotě 18-30 °C a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.

Neuchovávejte ho v ledničce, nezmrazujte, nezahřívejte a neskladujte výrobek při teplotě nad 30 °C.

#### Možné kontraindikace:

Propylenglykol:

- U jedinců užívajících Disulfiram (Antabus) nebo Metronidazol může vyvolat nežádoucí účinky.
- Může vyvolat alergickou reakci u lidí trpících atopií, dětským ekzémem či sennou rýmou.
- Laktázová acidóza se může projevit, pokud velké množství propylenglykolu zkonsumují děti, těhotné ženy či jedinci s jaterním nebo ledvinovým selháním.

Glycerol:

- Šance na dehydrataci je zvýšená u starších osob a jedinců trpících na dehydrataci.
- Opatrnosti je třeba dbát u lidí s diabetem, jelikož metabolizovaný glycerol může způsobit mírnou hyperglykémii nebo glykosurii.

#### Možné nežádoucí účinky:

Při prvním užití se může objevit podráždění v ústech, sucho v krku a kašel. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhoršují, navštivte vašeho praktického lékaře a nahláste podrobnosti o potížích