


INSTRUCTIONS



Ø 2 mm
12 mm

Nicotine/1 puff

1 Inhalations zug:

0mg	0,00mg
3mg	0,01mg
6mg	0,03mg
10mg	0,05mg
12mg	0,06mg
18mg	0,09mg
20mg	0,1mg

RITCHY EU s.r.o., Karla Engliše 519/11,
150 00 Praha 5, Czech Republic.
+420 225 067 840.

EN Instructions: 1) Unscrew bottle. 2) Open device e-liquid tank. 3) Squeeze e-liquid into tank according to device instructions. 4) Close bottle and tank. Store at 15–25°C. Not for use by people under 18 years old, non-smokers, pregnant, nursing, people with cardiovascular conditions, diabetes, asthma or people sensitive to content. Possible adverse effects: headache, dizziness, dryness in the mouth, nose, throat. Keep out of reach of children. Nicotine is highly addictive and toxic by inhalation, in contact with skin or if swallowed. If you feel unwell contact a poison control center or a doctor.



13871



13872

BG Инструкции: 1) Отворете капачката. 2) Отворете резервара на електронната цигара. 3) Издължайте течността в резервара според инструкциите на устройството. 4) Затворете вилката и резервара. Съхранявайте при 15–25°C. Да не се използва от лица под 18 години, непушачи, бременни, кърмачки, хора със сърдечноносъдъвни заболявания, диабет, астма или хора, чувствителни към съръдниканто. Пазете далеч от обсега на деца. Възможни странични ефекти: главоболие, замайване, сухота в устата, носа, гърлото. Никотинът е силно пристрастяващ и токсичен при вдъхване, при контакт с кожата или при попътване. Ако се чувствате зле, свържете се с центъра за отравяния или лекар.

CS Pokyny: 1) Odšroubujte uzávěr lahvičky. 2) Otevřete nádržku pro e-liquid na e-cigarette. 3) Napříte e-liquid do nádržky dle pokynu e-cigaretry. 4) Zavřete lahvičku a nádržku. Skladujte při 15–25°C. Není určeno pro osoby mladší 18 let, nekýraj, tehotný a kojící ženy, osoby s kardiovaskulárním onemocněním, diabetiky, astmatiky nebo osoby citlivé či zmenšené omybnou. Uchovávejte mimo dosah dítěti. Vyrobeno uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Možné nežádoucí účinky: bolest hlavy, závrat, suchot v ústech, nosu, krku. Nikotin je vysokovýkrovkový a toxický při vdechovaní, styku s pokožkou nebo při požití. Pokud se necítíte dobře, kontaktujte lékaře nebo toxikologické informační středisko, klinika pracovištního lékařství všeobecné fakultní nemocnice v Praze +420 224 91 92, 224 915 402.

DA Instruktioner: 1) Skru låget af flasken. 2) Åben enheden e-væskeholderen. 3) Tryk e-væske i tanken i overensstemmelse med enhedens instruktioner. 4) Luk flaske og tank. Opbevar ved 15–25°C. Ordberet ikke til brug for børn og unge, ikke-rygere, gravide, ammende, personer med hjertekarsygdomme, diabetes, astma eller personer som er følsomme overfor indhold. Opbevares utilgængeligt for børn. Mulige bivirkninger: hovedpine, svimmede hoved, torhed i mund, næse, hals. Nikotin er meget vanedannende og giftigt ved indåndning, ved hukstykke eller ved indtagelse. Hvis du føler dig utilpas, kontakt et giftkontrolcenter eller en læge.

EL Ινστρούκες: 1) Κεράκη παλέτα λαήτη. 2) Απόντε στην ενδιάμεση δοσηρή βάση. 3) Στρέψτε την ενδιάμεση δοσηρή βάση στην αντίστοιχη θέση. 4) Κλείστε την παλέτα και την ενδιάμεση δοσηρή βάση. Συντηρείτε σε θερμοπλαστική σακούλα με θερμοπλαστική πούρα από 15–25°C. Δεν είναι για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών, μη καπνιστές, εγκύων, θηλαζούσες, ατόμα με καρόπλαστικές πλαθυρίες, διαβητικούς, ασθενείς αδεμάτων ή ατόμα ευαίσθητα στην περιεργεία. Μακριά από παιδιά. Ήλιβες παρενέργειες: κεφαλαιγία, ζάχαρη. Εργάστηκε στο στομα, στη μητρ, στο λαιμό. Η νικοτίνη είναι ιδιαιτερά εθιστική και τοξική απόντες επιστρέψεις, επειδή με το δέρμα η σε περιπτώση κατάστασης (υγρά αναπλήρωσης) με νικοτίνη. Εάν αισθανθείτε οδοντοσέος, επικονινώνηστε με κέντρο έλεγχου δρηγοπραγμάτων ή με γαρύφαλο. Παρακαλείται από την RITCHY EU s. r. o. Διεύθυνση: Karla Engliše 519/11; 150 00 Praha 5, Δημοκρατία της Τσεχίας Τηλ.: +420 225 067 840

väga söltuvstektitav ja toksilinen sisehingamise, kokkupuutel nahaga või allanevalmisel. Kui teil on halb enesetunne, võtke ühendust mürjistuse juhtimiskeskusega või arstiga.

EL / GR Οδηγίες: 1) Ξεβιδώστε το μπουκάλι. 2) Αποίτε τη δεσμευτική υγρό αναπλήρωσης της συσκευής. 3) Βάλτε το υγρό αναπλήρωσης στη δεσμευτική, συμφωνα με τις διδύμες της συσκευής. 4) Κλείστε τη φάλα και τη δεσμευτική υγρό. Φυλασσετε στους 15–25°C. Δεν προσφέρεται για χρήση από άτομα κάτω των 18 ετών, μη καπνιστές, εγκύων, θηλαζούσες, ατόμα με καρόπλαστικές πλαθυρίες, διαβητικούς, ασθενείς αδεμάτων ή ατόμα ευαίσθητα στην περιεργεία. Μακριά από παιδιά. Ήλιβες παρενέργειες: κεφαλαιγία, ζάχαρη. Εργάστηκε στο στομα, στη μητρ, στο λαιμό. Η νικοτίνη είναι ιδιαιτερά εθιστική και τοξική απόντες επιστρέψεις, επειδή με το δέρμα η σε περιπτώση κατάστασης (υγρά αναπλήρωσης) με νικοτίνη. Εάν αισθανθείτε οδοντοσέος, επικονινώνηστε με κέντρο έλεγχου δρηγοπραγμάτων ή με γαρύφαλο. Παρακαλείται από την RITCHY EU s. r. o. Διεύθυνση: Karla Engliše 519/11; 150 00 Praha 5, Δημοκρατία της Τσεχίας Τηλ.: +420 225 067 840

ES Líquido para cigarrillo electrónico. Prohibida su venta a menores de 18 años. INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO: Agitar bien antes de usar. Girar hacia la izquierda presionando el tapón hacia abajo para evitar la rosca de seguridad de apertura anti niños. Instrucciones:

1) Abra la botella. 2) Abra el depósito de e-líquido del dispositivo. 3) Vierta el e-líquido en el depósito según las instrucciones del dispositivo. 4) Cierre la botella y el depósito. Conservar en un lugar fresco evitando la luz solar directa sobre el producto. Almacenar a 15–25°C. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Utilizar únicamente con cigarrillos electrónicos. Mantener lejos de alimentos, bebidas o piensos. ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES: No recomendado a jóvenes, no fumadores, mujeres embarazadas y lactantes, personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, asma o personas sensibles al contenido o si es usted alérgico al propileniglicol o a la glicerina. Mantener fuera del alcance de niños. EFECTOS ADVERSOS Y PRECAUCIONES: Posibles efectos adversos: dolor de cabeza, mareo, sequedad de boca, nariz o garganta. La NICOTINA es una sustancia muy adictiva y tóxica en contacto con la piel y por ingestión. Puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En caso de ingestión por accidente / o mal estar, acudir al médico y mostrar la etiqueta. Atención: Nocivo en caso de ingestión. CONSEJOS DE PRUDENCIA: Si se necesita consejo médico tener a mano el envase o la

etiqueta. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar al Instituto Nacional de Toxicología 915 620 420. NIVEL DE NICOTINA: Indicado en la etiqueta. Consumir preferentemente y late indicada en la etiqueta.

FI Käytöohjeet: 1) Avaa korkki. 2) Avaa laitteenvaihtoelementti. 3) Purista täytäntöön säiliötön laiteen ohjeiden mukaisesti. 4) Sulje pullo ja jääli. Varastoidaan 15–25°C lämpötilassa. Ei alä 18-vuotiaille, tupakoimattomille, raskaan olivelle, imettävälle, sydänvaihtoisille, kärpäisille, diabeetikille, astmatiikolle tai sisällölle yllättäville. Pitää poissa lasten ulottuvilta. Mahdollisia haittavaikutuksia: päänsärky; huumausta; suun, nenän ja kurun alueiden kuivumista. Nikotiini aiheuttaa voimakasta riippuvuutta ja on myrkyllistä hengityttynä tai nieltynä ja arsyttävä johtuen siihen iholle. Jos tunnet huononvointisuutensa, ota yhteys lääkärin tai myrkytyskeskukseen.

FR Mode d'emploi: 1) Dévissez la bouteille. 2) Ouvrir le réservoir de e-liquide de l'appareil. 3) Pressez le flacon de e-liquide pour remplir le réservoir en suivant les instructions de l'appareil. 4) Fermez la bouteille et le réservoir. Stocker à 15–25°C. Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans, par des non-fumeurs, par des femmes enceintes ou qui allaient, par des personnes atteintes de problèmes cardio-vasculaires, d'asthme ou par des personnes sensibles aux ingrédients. Tenir hors de portée des enfants. Effets secondaires possibles : maux de tête, étourdissements, sécheresse de la bouche, du nez et de la gorge. La nicotine crée une forte dépendance et est toxique par inhalation, par contact avec la peau ou par ingestion. Si vous ne vous sentez pas bien, contactez un centre antipoison ou un médecin. Centre Antipoison et de Toxicovigilance de PARIS, Hôpital Fernand WIDAL, 200 rue du Faubourg Saint Denis, 75475 Paris Cedex 10, tel.: 01 40 05 48 48. Centre antipoisons, Belgique: +32 (0) 24 245 245.

HR Upute: 1) Ovdjite čep na bočici. 2) Otvorite spremnik za e-tekućinu na uređaju. 3) Ištisnite e-tekućinu u spremnik u skladu s uputama uredaja. 4) Zatvorite bočicu i spremnik na uređaju. Cuvati na 15–25°C. Nije za upotrebu za osobe mlađe od 18 godina, nepušače, trudnice, odobore pod medicinskom skrbju, osobe s kardio-vascularnim zdravstvenim problemima, osobe s dijabetesom, astmom i osobe koje su osjetljive na sastavne čestice ove tekućine. Držati izvan dohvata djece. Mogući steni utjecaji: glavobolja, vrtoglavica, suha usta, nos i grlo. Nikotin je vrlo zarazan i toksičan za udihanje, u dodir s kožom ili ako se proguta. Ako se osjećate dobro, obratite se centru za kontrolu otrova ili liječniku.

HU Használati útmutató: 1) Csatlakoztatás a töltőtártály kúpkájához. 2) Nyissa fel készüléke tartályát. 3) Cseppentse a folyadékot a tartályba, oly módon, hogy az ne kerüljen szellőzőszűrűkba, a készülék erre vonatkozó leírását is figyelembe véve. 4) Zárja vissza készüléke tartályát. Húvós helyen tárolandó 15–25°C. Fogysztására nem ajánljuk a következők személyeknek: - 18 éves kor alattiak, nikotin vagy propilén-glikol allergiában szenvedők számára, magas vérnyomásban szenvedők és cukorbetegségek számára, terhes vagy szoptató nők számára, szívproblémával vagy érrendszeri megbetegedésekkel élők számára. Gyermektől elzárva tárolandó. Lehetőséges mellékhatások: fejfájás, szédülés, száj, orr, torok szárazsága. A nikotin erősen addiktív és mérgéző hatású, beleegyező, bőrrel érintkezve vagy lenyelve. Ha rosszul érzi magát, lépjön kapcsolatba egy mérgező központtal vagy egy orvosossal.

I Istruzioni: 1) Svitare la boccetta. 2) Aprire il serbatoio del liquido del dispositivo. 3) Versare il liquido nel serbatoio secondo le istruzioni del dispositivo. 4) Chiudere la boccetta e il serbatoio. Conservare a 15–25°C. L'utilizzo è vietato ai minori di 18 anni. Controindicato nei soggetti: non fumatori, alle donne in stato di gravidanza, alle donne che allattano, alle persone affette da problemi cardiovascolari, diabete, asma e agli individui sensibili al contenuto del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Possibili effetti avversi: mal di testa, vertigini, secca della bocca, del naso e della gola. La nicotina è altamente tossica per inalazione, a contatto con la pelle e se ingerita. In caso di maleducate, contattare un centro antiveneno o un medico.

I Instrukcja: 1) Spausdami žemyniatskute buteliuko kamsteli. 2) Atskutie ir pasiruoškite elektroninės cigarečių rezervuarą. 3) Įlaikykite skyčių ir rezervuarą, kaip nurodyta prieštala instrukcijoje. 4) Užsukite priplūdymą rezervuarą prie prietaiso. Laikyt 15–25°C temperatūroje. Nenaudoti asmenims iki 18 metų, jaunimui, nerakantiniams, nėščiams arba žindančioms kritūmių moterims, sergentiams širdies ir kraujagyslių ligomis, bronchine astme, cukriniai diabetu arba alergiškiems produktui sedamadosioms dalmis. Laikyt vaikams nepaisiakiamog vietoje. Galimas salutinis poveikis: galvos skausmas, svalgylus, nosies, burnos ar gerkišes sausumas ir sudringimumas. Nikotinas yra labai priklaušomas ir toksiskas iškėpus, susilietus su oda arba prariju. Jei jaučiateis blogai, kreipkitės į nuodujos kontrolierius centrą arba gydytojā.

LV Norādījumi: 1) Piešķiņiet atskrūvējiet pudelīti. 2) Atveriet ierīces e-šķīdruma tvertiņu. 3) Uzplūdīt

e-šķīdrumu tvertnē saskaņā ar ierīces norādījumiem. 4) Aizveriet pudelīti un tvertiņu. Uzglabāt 15–25°C temperatūrā. Nav paredzēts lietošanai personām, kas jaunākas par 18 gadiem, nesmeklētājiem, grūtīgcečiem, sieviešiem, kuras baro bērnu ar krūti, cilvēkiem ar sirds un asinsvadu slimībām, diabetu, astmu vai personām ar alergisku reakciju uz šķīdruma sastāvu. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Šepjāmi blakusefekti: galvassāpes, reibonis, sausums sajūta mutē, degunā vai kaklā. Nikotīns ir īoti atkarīgs un toksisks ieelpojot, nonākot saskarē arā ādu vai norijot. Ja jutāties slīkti, sazinieties ar īndes kontroles centru vai ārstu.

NL Gebruiksmaanwijzing: 1) Open de fles. 2) Open de e-vloeistof-tank van het apparaat. 3) Knip de e-vloeistof in de tank volgens de gebruiksaanwijzing van het apparaat. 4) Doe de fles in tank dicht. Beware bij een temperatuur tussen de 15°C en 25°C. Niet te gebruiken door personen onder de 18 jaar, niet-rokers, zwangere en zorgende vrouwen, mensen met hart- en vaatziekten, diabetici, mensen met astma of mensen die gevoelig zijn voor één of meerder van de ingrediënten. Buitenveld bereik van kinderen houden. Mogelijke bijwerkingen: hoofdpijn, duizelgelegenheid, droge mond, neus en keel. Nicotine is zeer verlengend en giftig bij inademing, bij contact met de huid of bij inslikken. Als u zich onwel voelt, neem dan contact op met een antitoxicocentrum of een arts. NVIC 030-2748888. Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen. Vergiftigingen informatie centrum, België: +32 (0)70 245 245.

NO Instruksjoner: 1) Skru opp flasken. 2) Åpne vasekbeholderen i e-sigaretten. 3) Fyll e-vaske i tanken i henhold til e-sigaretten instruksjon. 4) Skru igjen flasken og lukk tanken. Oppbevaringstemperatur: 15–25°C. Skal ikke benyttes av personer under 18 år, eldre, ikke-rykere, graviside, ammende, personer med hjerte-problemer, diabetes, astma eller folk som er følsomme for evaenskin innhold. Oppbevaringstilgangelig for barn. Mulige biverkringer: Hodepine, svimmelhet, torheit i munnen, næse, hals. Nikotin er svart vanedannende og giftig ved innånding, hudkontakt eller sveising. Hvis du føler deg ubehag, kontakt et giftkontrollsentralt eller en lege.

PL Instrukcje: 1) Odkręć butelkę. 2) Otwórz zbiornik na e-liquid w urządzeniu. 3) Wycisnąć e-liquid do zbiornika zgodnie z instrukcją urządzenia. 4) Zakręć butelkę i amknięj zbiornik. Przechowywać w temperaturze 15–25°C. Nie nadaje się do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia, niepalacze, kobiety w ciąży lub karmiące,

osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, cukrzycą, astmą albo wrażliwe na składniki produktu. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Możliwe działania niepożądane: ból i zwrotły głowy, suchość w ustach, w nosie i w gardle. Nikotyna silnie uzupełniająca i działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą lub po pokoleniu. Jeśli zie się poczujesz, skontaktuj się z centrum kontrolnym zatrutów lub lekarzem.

PT Instruções: 1) Abra o frasco. 2) Abra o tanque de e-liquido do dispositivo. 3) Aperte e despeje o e-liquido para o tanque seguindo as instruções do dispositivo. 4) Feche o frasco e o tanque. Conservar à temperatura de 15–25°C. Não se destina a ser utilizado por menores de 18 anos, fumadores, grávidas, lactantes, pessoas com doenças cardiovasculares, diabetes, asma ou pessoas sensíveis ao conteúdo. Manter fora do alcance das crianças. Efeitos secundários possíveis: dores de cabeça, tonturas, secura da boca, nariz e garganta. A nicotina é altamente viciante e tóxica por inalação, em contato com a pele ou se ingerida. Se você se sentir mal, entre em contato com um centro de controle de veneno ou um médico.

RO Instrucțiuni: 1) Deserubati capacul recipientului. 2) Deschideți rezervoul de e-lichid al dispozitivului. 3) Transferați e-lichid în rezervor conform instrucțiunilor dispozitivului. 4) Încărcați recipientul și rezervoul. A se depozita între 15–25°C. A nu se folosi de către persoanele minore (varaștă sub 18 ani), nefumatăre, însărcinate, care alăptăază, care suferă de boli cardiovasculare, diabet, astmă sau cele sensibile la continuu. Nu lăsați la îndemnarea copiilor. Printre efectele secundare posibile se numără: dureri de cap, ameteială, senzație de gură/jară sau gât uscat. Nicotina este foarte dependentă și toxică prin inhalare, în contact cu pielea sau prin înghitire. Da că va simțiți rău, contactați un centru de control al otrăvurilor sau un medic.

SL Navodila: 1) Odprite stekleničko. 2) Odprite rezervoar za e-tekočino na napravi. 3) Izčistite e-tekočino v rezervoar v skladu z navodili za napravo. 4) Zaprite stekleničko in rezervoar. Hranite pri temperaturi 15–25°C. Izdelka ne smejte uporabljati mlajši od 18 let, nekaladi, nosičnice, doječe matere, osebe s srčnožilnimi boleznjimi, sladkorom boleznjim, stmo ali osebe, ki so občutljive na katerokoli sestavino v izdelku. Hranite zunanj dosegot otrok. Možni neželeni učinkov: glavoljet, omotničnost, suha ust, nos in grlo. Nikotin je zelo zasvojen in strupen pri vdihavanju, v

stiku s kožo ali pri zaužitju. Če se počutiš slab, se obrnite na center za zstrupitve ali zdravnik.

SK Návod: 1) Odskrutkujte flášu. 2) Otvorte nádobu pre náplň. 3) Vyťlačte náplň do nádoby podľa pokynov pri dané zaradení. 4) Zavorte flášu aj nádobu. Skladujte pri teplote 15 až 25°C. Nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov, nefajčiarov, tehotné a dojčiace ženy, osoby s kardiovaskulárnymi problémami, cukrovkou, astmu alebo alergiou na danú látku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Možné nežiaduce účinky: bolest hlavy, nevnosť, suchosť v ústach, nose, hrde. Nikotín je vysoko návykňovací a toxický pri vdychnutí, pri kontakte s pokožkou alebo po požití. Ak sa nečíte dobré, kontaktujte centrum kontroly jedov alebo lekára.

SV Instruktioner: 1) Skruva upp flaskan. 2) Öppna enheten e-vätsketank. 3) Pressa e-vätska in i tanken enligt enheten instruktioner. 4) Stäng flaskan och tanken. Förvara vid 15–25°C. Inte för användning av personer under 18, icke-rykare, gravida, ammände, personer med hjärtsjukdomar, diabetes, astma eller personer med känsliga för innehållet. Förvara utom räckhåll för barn. Eventuella biverkringar: huvudvärk, yrsel, torhet i munnen, näsan, halsen. Nikotin är mycket beroendeframkallande och giftig vid inandning, hudkontakt och ingång till organ. Om du känner dig sjuk, kontakta en giftkontrollcentral eller en läkare.

DE Handhabungshinweise: 1) Flasche Aufbrechen; 2) Den Verdampfer Öffnen. 3) Die E-Liquid Flasche In Vorgeschriebener Art Und Weise Unterstützen Und Den Verdampfer Auffüllen. 4) Den Verdampfer Und Die E-Liquidflasche Schließen. Lagerung Zwischen 15–25°C. Nicht Für Den Gebrauch Von Personen Unter 18 Jahren, Nichtrauchern, Bei Schwangerschaft, Stillzeit, Für Personen Mit Kardiovaskulären Erkrankungen, Diabetes, Asthma Oder Personen Mit Empfindlichen Reaktionen Auf Die Inhaltsstoffe Geeignet. Darf Nicht In Die Hände Von Kindern Und Jugendlichen Gelangen. Mögliche Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Schwindel, Trockenheit Im Mund, Nase, Rachen. Nikotin Ist Stark Süchtig Und Giftig Beim Einatmen, Bei Berührung Mit Der Haut Oder Beim Verschlucken. Wenn Sie Sich Unwohl Fühlen, Wenden Sie Sich An Eine Giftnotrufzentrale Oder Einen Arzt. Giftninformationszentrum Berlin, Charité-Universitätsmedizin Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin, Telefon: +49 30 19240. Giftninformationszentrum, Belgien: +32 (0)70 245 245.