


ELFLIQ.

Toxicita:

Tento výrobek obsahuje nikotin, který může mít toxické účinky, pokud je užíván perorálně, zejména u kojenců nebo dětí. Při požití navštívte okamžitě svého praktického lékaře, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Pokud dojde k potísnění pokožky, opláchněte ji ihned studenou vodou a pokračujte 10-15 minut.

Náš výrobek má zabezpečenou trysku, která měří 9 mm na výšku a 2,3 mm v průměru, pro přesné plnění všech dostupných elektronických cigaret.



Pokyny pro doplnění:

- 1) Odšroubujte víčko lahvičky, vložte trysku do otvoru vešeho zařízení a ujistěte se, že tryska sedí v otvoru zařízení.
- 2) Stiskněte láhev, abyste naplnili zásobník zařízení, dbejte na to, aby nedošlo k přeplnění (informace o kapacitě viz návod k zařízení).
- 3) Po naplnění opatrně vyjměte trysku a dávejte pozor, abyste se výhnuli rozlití.
- 4) Uzavřete lahvičku s e-liquidem a uložte na bezpečném místě mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

(CS) VAROVÁNÍ: TENTO PRODUKT NENÍ URČEN PRO DĚTI A NEKUŘÁKY.



Made in China

Manufactured by:
IMIRACLE (HIQ) LIMITED

9 19H Maxgrand Plaza, No.3 Tai Yau Street,
San Po Kong, Kowloon, Hong Kong
+852 37088202 www.elliq.com

Grafické znázornění doplňování:

Tento produkt není určen pro těhotné nebo kojící ženy. Než začnete používat tento produkt, přečtěte si prosím pozorně tuto příbalovou informaci. Uchovávejte tuto příbalovou informaci, obsahuje důležité informace, které můžete znova potřebovat.

Návod k použití a skladování produktu:

Vždy se ujistěte, že je nádoba zcela uzavřená. Skladujte při teplotě mezi 18-30°C, mimo přímé sluneční záření. Neskladujte v ledničce či mrazáku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Možné kontraindikace:

Propylenglykol:

- U léčených jedinců může vyvolat nežádoucí účinky disulfiram nebo Metronidazol.
- Alergické reakce se mohou objevit u jedinců s anamnézou atopie, dětský ekzém nebo rýma (senná rýma).
- Laktátová acidóza se může objevit při použití velkého množství propylenglykol pokud je užíván dětmi, těhotnými ženami nebo jednotlivci se selháním jater nebo ledvin.

Glycerol:

- Pravděpodobnost dehydratace je zvýšená u starších osob a již dehydrovaných jedinců.
- Opatrnosti je třeba dbát u

jedinců s diabetem, metabolizovaný glycerol může způsobit mírnou hyperglykémii nebo glykosurii.

Možné nežádoucí účinky:

První uživatelé e-cigaretry mohou zaznamenat podráždění v ústech, sucho v krku nebo kašel. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se stane závažným, navštivte praktického lékaře a nahlásťte podrobnosti o incidentu podle poskytnutých pokynů v části Hlášení nežádoucích účinků. Abstinenční účinky mohou také nastat, pokud k uspokojení použijete nedostatečnou sílu nikotinu. Ty mohou zahrnovat podrážděnost, agresivitu, pocit slabosti, úzkost, neklid, špatná koncentrace, zvýšená chuť k jídлу, nutkání kouřit, poruchy spánku nebo snížení srdeční frekvence.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky v důsledku použití tohoto

produkту, vyplňte prosím online formulář na našich webových stránkách www.youreliquid-brand.com/safety-concerns nebo nahlášením na adresu:

Toxikologické informační středisko,
Klinika pracovního lékařství VFN a
1. LF UK, Na Bojišti 1, 120 00,
Praha 2, tel: 224 919 293 a 224 915
402.

Návykovost:

Tento produkt obsahuje nikotin, který je vysoce návyková látka, a proto se nedoporučuje užívat nekuřáky a osobami mladší 18 let. Žádná další složka v tomto produktu, kromě nikotinu, není návyková.